


KACSGÁTLÁS

Royaltac[®] N

Royal[®] MH30

KÉSZÍTMÉNYEKKE



A Chemtura a dohányipari szereplőkkel szoros együttműködésben fontos feladatának tartja, hogy a dohánytermesztőket az általa forgalmazott termékek használatával kapcsolatban megfelelő technológiai ajánlásokkal lássa el.

A technológia helyes alkalmazása a feldolgozók számára egységes nyersanyag biztosításának lehetőségét jelenti.

A termékek helyes felhasználása az utóbbi néhány év folyamán kissé megváltozott, ezért is érdemes figyelembe venni a Chemtura technológiai javaslatait.

 **Chemtura**
AGROSOLUTIONS™

Royaltac N

Kontakt hatású kacságtló permetező szer

A Royaltac N kontakt hatású kacságtló készítmény. Ezért csak a kihajtott hónaljajtásokat (kacsokat) lehet vele leperzselni. A készítményt eredményesen alkalmazhatjuk a tetejézés előtt vagy a tetejézés után. Kijuttatásának időpontját egyedül a kacsok fejlettsége (1-2 cm) határozza meg. A 2 cm-es, vagy annál nagyobb hónaljajtásokat mechanikai úton (kézzel) kell eltávolítani. Az ennél kisebbek ellen hatásosan alkalmazható a Royaltac N. A készítményt kijuttathatjuk növény egyedenként kézzel (öntéssel), háti permetezővel (csorgatással) vagy szántóföldi permetező géppel (csorgatással). Ügyelni kell arra, hogy a közben a levél fonákjára nem kerülhet a Royaltac N, mert az a levél perzselését eredményezheti.

Javasolt adagja:

Kijuttatás	Dohány típusa	
	Virginia (20000-25000 tő/ha)	Burley (18000-20000 tő/ha)
kézi	4,5 l + 95,5 l víz 25,0 ml/növény	3 l + 97 l víz 25,0 ml/növény
háti géppel történő csorgatás	4,5 l + 95,5 l víz 25,0 ml/növény	3 l + 97 l víz 25,0 ml/növény
szántóföldi géppel történő csorgatás	20 l/ha + 580 l/ha víz	20 l/ha + 580 l/ha víz
szántóföldi géppel történő permetezés	20 l/ha + 580 l/ha víz	20 l/ha + 580 l/ha víz

Burley típusú dohány esetén a kezelést 7-10 nap elteltével célszerű megismételni. Virginia dohány esetében, amennyiben kiegészítő kezelésként nem tervezzük a felszívódó hatású Royal MH-30 kacságtló szer alkalmazását, a kezelést 5-10 nap múlva javasolt megismételni.

Alkalmazás-technológiai javaslat:

- A hónaljajtásoknak közvetlenül érintkezniük kell a készítménnyel.
- A csorgatásos, hátigépes kijuttatást szórófej nélkül, egyéb csőszűkítő alkalmazásával, kis nyomáson végezzük.
- A szántóföldi permetezőgéppel végzett csorgatásos kijuttatást 0,5 bar nyomáson, a sor fölé belógó szórófejekkel hajtsuk végre.
- Szántóföldi permetezőgéppel 1,0 bar nyomáson, soronként 3 darab speciálisan beállított szórófejjel végezzük a kijuttatást.
- A permetezést a reggeli harmat felszáradása után végezzük el.
- Közvetlenül eső után, illetve nedves levélfelületre ne permetezzünk.
- Csak szélcsendes időben alkalmazzuk a készítményt.
- Fejletlen, beteg ültetvényt ne kezeljünk Royaltac N-nel.



Royal MH-30

Felszívódó hatású kacságtló peremetező szer

A Royal MH-30 felszívódó hatású, a kacsok kifejlődésének megakadályozására használható készítmény Virginia típusú dohány kezelésére. A készítményt csak a tetejézés elvégzése után alkalmazhatjuk eredményesen. Kijuttatáskor figyelemmel kell lenni a felső levelek és az esetlegesen kihajtott kacsok fejlettségére is. A Royal MH-30-at akkor alkalmazhatjuk, amikor a dohány felső levelei elérték a 15-20 cm-es hosszúságot. A hónaljajtások nagysága pedig nem haladja meg az 1-1,5 cm-t. Az ennél nagyobb kacsokat kézzel vagy kontakt kacságtló szer alkalmazásával el kell távolítani a Royal MH-30-as permetezés előtt. A készítményt csak szántóföldi permetezőgéppel lehet kijuttatni.

Javasolt adagja:

Kijuttatás	Dohány típusa
	Virginia (20000-25000 tő/ha)
szántóföldi géppel történő permetezés	15-17,5 l/ha

Alkalmazás-technológiai javaslat:

- A permetezést finom porlasztással végezzük.
- A növény felső 1/3-1/2 részének kell csak érintkeznie a készítménnyel.
- A kijuttatást a reggeli órákban végezzük (a harmat felszáradása után).
- Közvetlenül eső után, illetve nedves levélfelületre ne permetezzünk (felszívódási idő 6-8 óra).
- Esőzés vagy öntözés után csak 48 óra elteltével alkalmazzuk.
- Ha a kezelés után 6 órán belül eső esik, hatáscsökkenéssel lehet számolni a szernak a levélről történő lemosódása következtében.
- Intenzív esőzés után meg kell ismételni a kezelést, de csak fél dózissal.
- Meleg nyári napokon, amikor a levelek a turgorukat elvesztik, hervadtak (25 °C felett), nem ajánlott a permetezés.
- Normál talajnedvességnél gyorsan felszívódik/mozog a növényben, gyorsan megkezd a hatás kifejlesztését.
- Párás időben gyorsabban szívódik fel, ami optimális kacságtlást eredményez. Száraz időben a lassúbb felszívódás miatt valamivel gyengébb hatást kapunk.
- A készítményt egyéb készítményekkel ne keverjük, önmagában juttassuk ki.
- A Royal MH-30 kijuttatása után a dohány betakarítását csak legalább 10 nap elteltével lehet megkezdeni.
- Az előírt 80 mg/kg szermaradék határérték csak a tenyészidőszakonkénti 1 kezeléssel lehet biztosítani (kivéve esőzés utáni ismételt kezelés fél dózissal).

A KÉSZÍTMÉNY FELHASZNÁLÁSA ELŐTT OLVASSA EL A CÍMKÉT ÉS A RAJTA LÉVŐ FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁST!



www.chemturaagrosolutions.com

További információért szíveskedjen a Chemtura Europe Ltd. Magyarországi Fióktelepének helyi munkatársaihoz fordulni:

Kertész Péter	Északkelet-Magyarország	0036 (30) 6552 - 779
Weszp Mihály	Kelet-Magyarország	0036 (30) 9325 - 444
Törőcsik Éva	Délkelet-Magyarország	0036 (30) 9325 - 555
Vados Csaba	Kelet-Dunántúl	0036 (30) 5524 - 791
Kovács Balázs	Nyugat-Dunántúl	0036 (30) 4747 - 457

web: www.chemtura.hu

e-mail: info@chemtura.hu

Chemtura Europe Ltd.
Magyarországi Fióktelepe
1138 Budapest,
Madarász Viktor u. 47-49.

Chemtura Europe Ltd.
Kennet House, 4 Langley Quay
Slough, Berkshire, SL3 6EH
United Kingdom
(PMxxx)

* Chemtura Corporation

* Royaltac, Royal MH-30 a Chemtura Corporation bejegyzett márkanéve.