



ULT Magyarország Zrt.



Tisztelt Dohánytermelő! Tisztelt Kollégánk!

Az alábbi dokumentum az ULT Magyarország Zrt és a Nyidoter Kft a 2014-es termesztési szezonra vonatkozó ajánlott kacsgátlási technológiáját tartalmazza.

Korábban azt mondtuk, hogy sikeres kacsgátlással a termelő magasabb hozamot és jobb minőséget ér el, így a többlet ráfordításon felül, jelentősen növeli az árbevételét, javítva tevékenységének jövedelmezőségét. Most egy újabb szempontra is felhívjuk termelőink figyelmét. A kacsgátlás hiánya, vagy a nem megfelelően elvégzett kacsgátlás, intenzív kacskepződést idéz elő az ültetvényekben, melyek a betakarítást követően szennyeznek az értékesítésre felajánlott dohányokat. Az elmúlt években folyamatosan fordult elő ez a probléma, ami a leveles dohányok feldolgozását megnehezítette és egyben veszélyeztette a fermentált dohányaink értékesítését.

Az ULT Magyarország Zrt 2014. évi termés felvásárlásánál továbbra is „zéró toleranciát” alkalmaz ezen a téren, tehát semmilyen kacs eredetű szennyeződést nem fogad el a felvásárláskor a termelői leveles dohányokban! Cégünk minden eszközzel arra törekszik, hogy termelői rendelkezzenek az ezen a téren szükséges tudással és részükre időben elérhető legyen a szükséges kacsgátlószer. Csak ezzel a határozott szigorral biztosítható az „idegen anyag” mentes magyar dohány, melyet a piac megkövetel tőlünk.

A hónaljörügy (kacsok) növekedés gátlása a dohánytermesztés sikerességét alapvetően befolyásoló agrotechnikai elem. A korábbi évek termesztési tapasztalatai alapján fontos a hatékony, költségtakarékos és egyben alacsony növényvédőszer maradékot eredményező technológiai eljárás megismertetése és pontos alkalmazása. A rosszul, vagy hiányosan elvégzett kacsgátlás a megtermelt dohányt értékét csökkenti, azt piacképtelenné teszi!

Minden dohánytermelőnek a saját termesztési körülményei között a legmegfelelőbb alkalmazható kacsgátlási gyakorlatát már a termesztési szerződés kötésénél ki kell alakítana, hogy ennek megfelelően rendelkezze meg az éves kacsgátlószer igényét a Nyidoter Kft agronómusán keresztül.

Az integrált termesztés a dohány művelése során is követendő alapvető elvárás. A hazai dohánytermesztésben általánosan elterjedt kacsgátlási beidegződött termelői gyakorlatok nagyrészt helytelenek, szakmailag nem megalapozottak. Az elmúlt évtizedben kacsgátlási kísérletek hosszú sorát végeztük el, melyek eredményeit kiértékelve az alábbi technológiai javaslatot tesszük az Ön részére, figyelembe véve az érvényben lévő szabályzókat és a vevői elvárásokat.

AJÁNLOTT TECHNOLÓGIA

Szer neve	Kijuttatás időpontja	Javasolt dózis	Vízmennyiség
ROYALTAC (n-dekanol)	teljes virágzáskori tetejezés után. A hónaljajtások 1,0-2,0 cm-es nagysága estén. <i>(Nem biztosít teljes kacsmentességet a teljes tenyészidőszakra!)</i>	18 liter/ha (25 ml/tő minimális mennyiségben, biztosítva a száron történő lefolyást)	500 liter/ha alacsony nyomás, nagy cseppképzés
ROYAL MH-30 (maleinsav-hidrazid)	30 cm-nél nagyobb hegylevél esetében. A hónaljajtások 1,0-1,5 cm-es nagysága estén.	15 liter/ha	400 liter/ha magas nyomás, jó porlasztás

ROYALTAC:

- Kezelések száma 1 vagy 2, az ültetvények fejlettségi állapotának megfelelően.
- Öntözött, jól fejlett ültetvényekben a kétszeri kezelés ajánlott.
- Élelmezési várakozási idő nincs.

ROYAL MH-30:

- Kizárólag csak egyszeri kezelés ajánlott.
- A kacsgátlószer nem használható fel érésgyorsításra, többszöri kezelésre, mert a kijuttatott szermennyiség az engedélyezett határérték feletti visszamaradt hatóanyag maradékot eredményez a szárított dohányban.
- A kacsgátlószer kijuttatásával egy menetben más növényvédőszer kijuttatása tiltott! A kacsgátlószer tapadásfokozó adalékot tartalmaz, így a bekevert egyéb növényvédőszer a megengedett szintnél nagyobb hatóanyag maradékot okoz a szárított dohányban.
- A kezelést követő 10-15 napon belül a betakarítás tilos, mivel az ettől eltérő gyakorlat a megengedett szint fölötti szermaradék mennyiséget idéz elő a szárított levélben!

Engedélyokiratban leírtak szerinti felhasználás.

ROYALTAC:(12271/2002 (02.5/2142/1/2007, 04.2/5671-2/2012)

ROYAL MH-30:(02.5/447/1/2010)

ESETILEG ALKALMAZHATÓ, DE NEM AJÁNLOTT TECHNOLÓGIA!

TANK KEVERÉKES TECHNOLÓGIA

(TECHNOLÓGIAI KISÉRLETEK, VALAMINT TERMELŐI GYAKORLAT ALAPJÁN)

Szer neve	Kijuttatás időpontja	Javasolt dózis	Vízmennyiség
ROYALTAC (n-dekanol)	Teljes virágzást követően, a tetejezéssel egyidőben. A hónaljhajítások 1,0-1,5 cm-es nagysága estén.	10 liter/ha	500 liter/ha csurgatással, vagy alacsony nyomáson történő permetezéssel a szárcsonkokra irányított sugárral
PENDIGAN 330 EC (pendimetalin)		5 liter/ha	

Engedélyokiratban leírtak szerinti felhasználás.

ROYALTAC:(12271/2002 (02.5/2142/1/2007, 04.2/5671-2/2012)

PENDIGAN 330EC / STOMP SUPER:(04.2/4314-1/2012, 02.5/1120/1/2009)

Felhívjuk figyelmét, hogy a **PENDIGAN 330 EC, STOMP SUPER** készítmények jelenleg érvényes felhasználási engedéllyel rendelkeznek a dohány kacsgátlásra, de a korábbi kedvezőtlen vevői tapasztalatok alapján használatuk az ULT Magyarország Zrt – Nyidoter Kft termelői körében **kacsgátlásra nem javasolt**. (nem kívánatos a **pendimetalin** növényvédőzer szermaradék jelenléte a fermentált dohányban)

A tárolás és felhasználás során az engedélyokiratokban leírtakat szigorúan be kell tartani.

A megengedett dózis emelése technológiai és növényélettani szempontból indokolatlan. Kérjük a kezelések folyamán kerülje a felesleges környezeti terhelést és minden esetben rögzítse a Növényvédelmi naplóba annak tényét és paramétereit.

A felhasználás folyamán a dohánytermelőnek be kell tartania a NYIDOTER KFT 2007-ben elfogadott Környezetvédelmi Szabályzatában előírtakat, mely az éves termesztési szerződés általános feltételeit tartalmazó mellékletében megtalálható.

A technológiát összeállította: Fekete Tibor, ULT Magyarország Zrt.

Nyíregyháza, 2014. Január 24.