



ULT Magyarország Zrt.



Tisztelt Dohánytermelő! Tisztelt Kollégánk!

Engedje meg, hogy bemutassuk az alábbiakban a 2011-es termesztési szezonra vonatkozó ajánlott kacságtlási technológiánkat.

A hónaljrügy (kacsok) növekedés gátlása a dohánytermesztés sikerességét alapvetően befolyásoló agrotechnikai elem. A korábbi évek termesztési tapasztalatai alapján fontos a hatékony, költségtakarékos és egyben alacsony növényvédőszer maradékot eredményező technológiai eljárás megismertetése és pontos alkalmazása. A rosszul, vagy hiányosan elvégzett kacságtlás a megtermelt dohányt értékét csökkenti, azt piac-képtelenné teszi!

A saját termesztési körülményeinek legmegfelelőbbben alkalmazható kacságtlási gyakorlatát már a termesztési szerződés kötésénél ki kell alakítana, hogy ennek megfelelően rendelhesse meg az éves kacságtlószert igényét a Nyidoter Kft agronómusán keresztül.

Az integrált termesztés a dohány művelése során is követendő alapvető elvárás. A hazai dohánytermesztésben általánosan elterjedt kacságtlási gyakorlatok nagyrészt helytelenek, szakmailag nem megalapozottak. Az elmúlt évtizedben kacságtlási kísérletek hosszú sorát végeztük el, melyek eredményeit kiértékelve az alábbi technológiai javaslatot tesszük az Ön részére, figyelembe véve az érvényben lévő szabályzókat és a vevői elvárásokat.

AJÁNLOTT TECHNOLÓGIA

Szer neve	Kijuttatás időpontja	Javasolt dózis	Vízmenyiség
ROYALTAC (n-dekanol)	teljes virágzáskori tetejezés után (Nem biztosít teljes kacs- mentességet a teljes tenyészidőszakra!)	18 liter/ha	500 liter/ha alacsony nyomás, nagy cseppképzés
ROYAL MH-30 (maleinsav-hidrazid)	30 cm-nél nagyobb hegylevél esetében	15 liter/ha	400 liter/ha magas nyomás, jó porlasztás

Engedélyokiratban leírtak szerinti felhasználás.

ROYALTAC: 9649/1992 (12271/2002 (02.5/2142/1/2007)

ROYAL MH-30: 12401/2002 (65176/1989, 8789/1983) (02.5/2141/1/2007) 02.5/447/1/2010

ESETILEG ALKALMAZHATÓ, DE NEM AJÁNLOTT TECHNOLÓGIA!

TANK KEVERÉKES TECHNOLÓGIA

(TERMESZTÉSI KISÉRLETEK, VALAMINT TERMELŐI GYAKORLAT ALAPJÁN)

Szer neve	Kijuttatás időpontja	Javasolt dózis	Vízmennyiség
ROYALTAC (n-dekanol)	teljes virágzást követő tetejezéssel egyidőben	10 liter/ha	500 liter/ha csurgatással, vagy alacsony nyomáson történő permetezéssel a szárcsonkokra irányított sugárral
STOMP 330 EC (pendimetalin)		5 liter/ha	

Engedélyokiratban leírtak szerinti felhasználás.

ROYALTAC: 9649/1992 (12271/2002 (02.5/2142/1/2007)

STOMP 330: 24222/1982 (18552/1995, 2194/2004, 22432/1987, 3288/1986, 49223/2000, 65125/1989, 8219/1983, 9211/1992)

Felhívjuk figyelmét, hogy a **STOMP 330, STOMP 400 SC, STOMP SUPER** készítmények jelenleg érvényes felhasználási engedéllyel rendelkeznek dohány kacsgátlásra, de a korábbi kedvezőtlen vevői tapasztalatok alapján használatuk az ULT Magyarország Zrt – Nyidoter Kft termelői körében **kacsgátlásra nem javasolt**. (nem kívánatos **pendimetalin** növényvédőzer szermaradék jelenléte a fermentált dohányban)

A tárolás és felhasználás során az engedélyokiratokban leírtakat szigorúan be kell tartani.

A megengedett dózis emelése technológiai és növényélettani szempontból indokolatlan. Kérjük a kezelések folyamán kerülje a felesleges környezeti terhelést és minden esetben rögzítse a Növényvédelmi naplóba annak tényét és paramétereit.

A felhasználás folyamán a dohánytermelőnek be kell tartania a NYIDOTER KFT 2007-ben elfogadott Környezetvédelmi Szabályzatában előírtakat, mely az éves termesztési szerződés általános feltételeit tartalmazó mellékletében megtalálható.

A technológiát összeállította: Fekete Tibor, ULT Magyarország Zrt.

Nyíregyháza, 2011. Január 24.