



A dohány rovarvédelme és stresszoldása FMC készítményekkel



Máriapócs 2026.02.04.

Rácz Tibor

06

GYOMIRTÓ SZEREK

Ally® Max SX® gyomirtó szer	7
Aurora® 40 WG gyomirtó szer	8
Aurora® Gold gyomirtó-kombináció	9
Diniro® gyomirtó szer	10
Diniro® család megújult listája	11
Diniro® Gold gyomirtó-kombináció	12
Diniro® Flex gyomirtó-kombináció	14
Express™ 50 SX® gyomirtó szer	16
Evorelle® Express™ gyomirtó szer	20
Foxtrot® EW gyomirtó szer	21
Granstar® 50 SX® gyomirtó szer	22
Granstar® Super 50 SX® gyomirtó szer	23
Granstar® SuperStar LQM® gyomirtó-kombináció	24
Nero® gyomirtó szer	27
Nic-It® gyomirtó szer	28
Pointer® Star LQM® gyomirtó-kombináció	30
Reactor® Micro gyomirtó szer	32
Refine® 50 SX® gyomirtó szer	33
Spotlight® Next gyomirtó szer	34
Successor® 600 gyomirtó szer	36
Successor® TX gyomirtó szer	37
Tripli® gyomirtó szer	40

43

GOMBAÖLŐ SZEREK

Azaka® gombaölő szer	44
Azaka® Top New gombaölő-kombináció	45
Bordóilé Neo SC gombaölő szer	46
Bordóilé + Kén Neo SC gombaölő szer	47
Priori® Gold gombaölő szer	48
Riza® 200 EC gombaölő szer	51
Vendetta® gombaölő szer	52

53

ROVARÖLŐ SZEREK

Benevia® rovarölő szer	54
Coragen® 20 SC rovarölő szer	58
ARC™ farm intelligence	64
Divam® Pro rovarölő szer	66
Exirel® SE rovarölő szer	68
Kendo® 5 CS rovarölő szer	70
Nexsuba™ rovarölő szer	72
Nuyard® rovarölő szer	74
Verimark® rovarölő szer	76

77

BIOLÓGIAI TERMÉKEK

Accudo® biostimuláns	80
RhizoMagic™ növény- és talajkondicionáló	84

92

EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

Cervacol® Extra vadriasztó szer	93
Komplex Kénészor™	94
Trend® 90 permetezőszer-segédanyag	96

102

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATOK

Technológiai csomagok	102
-----------------------	-----

A dohány levelét károsító kártevők:

A magyarországi dohánytermesztési környezetben leginkább előforduló kártevők a **gyapottok bagolylepke, vetési bagolylepke, dohánytripsz és levéltetvek.**

A lombrágó hernyók nagy problémát okoznak a dohánykultúrában. A lárvák rágása és az általuk okozott levél-elszíneződés mennyiségi és minőségi károkat is okoz a dohány levelén.

A lárvák roncsolják a levelek szerkezetét és befolyásolják a levélemeletek integritását, ennek következtében romlik a dohány minősége.



2025. Szabolcs megye



2025. Szabolcs megye



A dohány fontosabb kártevői



Vetési bagolylepke és lárva a mocskospajor

Gyapottok bagolylepke és lárva



Dohánytripsz

Zöld őszibarack levéltetű

Forrás: internet

Benevia dohányban



An Agricultural
Sciences Company



Benevia®

Hosszan tartó hatás a dohány kártevői ellen

**A Benevia[®] egy Cyazypyr[®] (ciántraniliprol)
hatóanyagú termék, mely rendkívül jó
hatékonysággal rendelkezik a szívó, rágó és
aknázó kártevőkkel szemben.**

Széles hatásspektrum a szívó, rágó és aknázó kártevők ellen

FMC

An Agricultural
Sciences Company



Hatékonyság a leginkább veszélyes kertészeti rovarkártevők ellen

Károsítók	Cyazypyr® Group 28	Imidakloprid Group 4A	Spirotetramat Group 23	Indoxakarb Group 22	Spinetoram Group 5	Jelzés	Hatékonyság
Levéltetvek	++	+++	+++	-	-	+++	91-100%
Mezei kabócák	++	++	+	-	-	++	75-90%
Liszteske	+++	++	+	-	-	+	60-75%
Tripszek	++	+	-	-	+++	-	<60%
Bolhák	++	+++	-	+	-		
Ormányosok	++	++	-	++	-		
Gyümölcslegyek	+++	+++	-	+	++		
Levélnézók	+++	++	+	+	++		
Levéldarazsak	++	++	-	++	++		
Lepkék	+++	-	-	+++	+++		


Source: Internal field trials, summary of multiple trials across geographies (2005-2011)

Hatékonyság eltérő fejlődési stádiumú kártevők esetében

A Cyazypyr® hatékonysága eltérő fejlődési állapotú rovarok esetében				Jelzés	Hatékonyság
Kártevők	Fejlődési állapot			+++	Magas
	Tojás	Lárva	Imágó	++	Közepes
Molyok	+++	+++	+	+	Alacsony
Bolhák	n/a	+++	+++		
Ormányosok	n/a	n/a	++		
Levélnézók	n/a	+++	+++		
Liszteske	+++	+++	+++		
Levéltetvek	+	+++	++		
Tripszek	+	++	++		


A károsítás azonnali leállítása

A kártétel leállításához szükséges idő (LT₅₀ óra) káposzta bagolylepke lárvák esetében káposztalevélen



Az elmúlt években világszerte végeztek hatékonysági vizsgálatokat, hogy alátámasszák a Benevia® kezelések hatékonyságát a dohány levélkárosítóval szemben

Helicoverpa armigera levélkárosítása %-ban (Verona, 2016.)



- **BENEVIA®** technológiai javaslat Dohányban



Benevia®
Dózis: 0,5 l/ha

Benevia®
Dózis: 0,5 l/ha

Benevia engedélyokirat 2025. részlet

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	A kezelések közötti minimális időtartam (nap)	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
dohány (palántanevelés során)	dohánytripsz, vetési bagolylepke, gyapottok- bagolylepke	1	-	10 ml/10 l (0,1%)	300	egy lombleveles állapottól 6-7 leveles állapotig (kiültetésig) (BBCH 11-17)
dohány (szabadföldi)	dohánytripsz, vetési bagolylepke, gyapottok- bagolylepke	1	-	0,5	300-800	6-7 leveles állapottól (kiültetéstől) virágbimbók megjelenéséig (BBCH 17-51)

Dohányban a *dohánytripsz* ellen a tojásrakás kezdetén, az első lárvák megjelenése előtt kell a kezelést elvégezni. A *dohánytripsz* betelepődése kék, fehér vagy sárga színű ragacsos lapokkal végzett csapdázással előre jelezhető. A *vetési bagolylepke* és a *gyapottok-bagolylepke* esetében a tojásrakás kezdetén, a lárvakeelés előtt célszerű a készítményt kijuttatni. A bagolylepkék rajzása szexferomon csapdával nyomon követhető. A tojásrakás kezdete növényvizsgálattal figyelhető meg.

- A **Benevia**[®] fő jellemzője a hosszú tartamhatás
- Szélsőséges körülmények között is (pl.: magas hőmérséklet) a **Benevia**[®] hatékonysága maximális marad
- Más termékekkel szemben, melyek hatékonyságukból veszítenek a nyári hónapokban (pl.: piretoidok), a **Benevia**[®]-kezelések kiváló védelmet nyújtanak a dohány számára
- A **Benevia**[®]-val még a nap legforróbb és legnaposabb óráiban is végezhetőek a kezelések
- A kezelések megkezdése előtt ajánlott a célkártevő rajzásgörbéjét megfigyelni, a kezelést pedig a tojásrakás időszakára időzíteni.

Elérhető közelségben az **Apprakész** rajzásmegfigyelő rendszer.

ArcTM farm
intelligence



Töltse le az Applikációt és tájékozódjon első kézből!

- Célzott és fenntartható rovarölőszer-használat.
- Kevesebb rovarmegfigyelési munka és alacsonyabb költségek.
- Magasabb hozamok és jobb jövedelmezőség.
- Hatékony munkaszervezés.



További információ:
www.fmcagro.hu/arc

Segítség a megalapozott döntésekhez

- Hol, mikor és hogyan szükséges a védekezés?



1 Automatikus rovarmegfigyelés



2 Vizuális fogási eredmények



3 Fogási diagramok



4 Közvetlen kommunikáció



Benevia®

insect control

powered by
CYAZYPYR®
active ingredient



✓ 100 g/l Cyazypyr® hatóanyag (ciántraniliprol)

✓ I. és II. forgalmi kategória

✓ Kontakt, felszívódó és transzlamináris

✓ Valódi tojásölő hatás

✓ Lárván, imágón izomösszehúzódást gátol

✓ Hosszú tartamhatás (akár 19 nap)

✓ Szívó-, lepke- és rágókártevők ellen


Verimark®
insect control

powered by
CYAZYPYR®
active ingredient



Benevia®
insect control

powered by
CYAZYPYR®
active ingredient



Exirel™
insect control

powered by
CYAZYPYR®





Kendo® 5 CS rovarölő szer


Tartamhatású piretroid
az FMC kínálatában!



An Agricultural
Sciences Company

Kendo 5 CS® 20 SC (lambda-cihalotrin) rovarölő szer

- **Mikrokapszulázott rovarölő szer**
- **3-5 nap tartamhatással**
- **UV álló, esőálló piretroid**



Kendo® 5 CS rovarölő szer

Hatóanyag: 50 g/l lambda-cihalotrin

Kiszerelés:

1 literes műanyag
kanna

Forgalmazási kategória: III.

Alkalmazási javaslat:

- Kukorica:** kukoricabogár ellen (0,25-0,3 l/ha
- Zöldségfélék, gyümölcs:** engedélyokirat szerint
- Cukorrépa, bíborhere, mák:** engedélyokirat szerint

Kultúra	Károsító	csonthejasok (őszibarack, kajszí, szilva, cseresznye, meggy)	gyümölcsmolyok, levéltetvek, levélbolha, cseresznyelég, aranyos eszeleny
mogyoró	levéltetvek, mandula-magdarázs	mogyoróormányos	foltozzárnyú muslica
mandula	repcebolha, lisztes repcebarkó, levéltetvek, bagolylepkek lárvái	dió	almamoly, levéltetvek, dióburok-fürölég
cukorrépa	levéltetvek, poloskák, bagolylepkek lárvái	szőlő	szőlómolyok foltozzárnyú muslica amerikai szőlőkabóca
napraforgó	kukorica (takarmány, vetőmag, csemege)	szamóca (szabadföldi)	levéltetvek, foltozzárnyú muslica
kukorica	repce, fehér mustár	ribiszke, kószméte, málna, szeder	levéltetvek, foltozzárnyú muslica
őszi káposzta- repce,	burgonya	fekete bodza	amerikai fehér szövőlepkék, levéltetvek
fehér mustár	lucerna	paprika	bagolylepkek lárvái, levéltetvek
	bíborhere	paradicsom (hajtatott)	bagolylepkek lárvái, levéltetvek
	almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	paradicsom (szabadföldi)	bagolylepkek lárvái, levéltetvek
		uborka	bagolylepkek lárvái, levéltetvek
		fejes káposzta, bimbós kel, karfiol, brokkoli, kelkáposzta	bagolylepkek lárvái, levéltetvek, káposztapoloska
		borsó (zöld- és szárazborsó)	levéltetvek
		bab (zöld- és szárazbab)	gyapottok-bagolylepke
		gyógy növények (macskagyökér, körömvirág, kamilla, római kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, orvosi csucsor, levendula, vassfű, lósóska)	levéltetű-, lepke-, poloska-, földi bolha fajok
		dohány	levéltetvek, bagolylepkek
		rizs	tollas árvaszúnyog, rizs- árvaszúnyog, rizsfaj, nyári pajzsosrák, tapadó lencserák, zöld vándorpoloska
		mák	máktokormányos, fekete répa-levéltetű
		cékla	levéltetvek, repcebolha, bagolylepkek lárvái
		sárgarépa	levéltetvek, légyfajok
		saláta	bagolylepkek lárvái, levéltetvek
		torma	földibolha, káposztapoloska
		tojásgyümölcs (szabadföldi, hajtatott)	bagolylepkek lárvái, levéltetvek
		borsmustár (rukkola), galambbegy saláta	bagolylepkek lárvái, levéltetvek
		sóska, spenót (szabadföldi)	bagolylepkek lárvái, levéltetvek
		zöld gyógy növények (metélgöngy, metélgöngy, metélgöngy, metélgöngy, kapor, angyalka, angyalka, leány, szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya, izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaryn, koriander, bazsalikom, menta, majoránna, zamatos turbolya)	bagolylepkek lárvái, levéltetvek, poloskák
		vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma	levéltetű-, lepke-, légy-, tripszfajok
		új hagyma	levéltetű-, légy-, lepke-, tripszfajok
		édeskömény	levéltetű-, lepke-, poloska-, földi bolha fajok

A Kendo® 5 CS a Syngenta márkaneve

Kendo 5 CS® 20 SC rovarölő szer

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	A kezelések közötti minimális időtartam (nap)	Dózis (l/ha)	Víz mennyiség (l/ha)	Az utolsó kezelés fenostádiuma
dohány	levéltetvek, bagolylepkék	2	10	0,2	400-800	levélfejlődés vége (betakarítás előtt 7 nappal) (BBCH 49)

Dohányban a *levéltetvek* ellen a védekezést a kártevők megjelenésekor, a kis kolóniák kialakulása előtt kell elkezdeni. A *bagolylepkék* lárvái ellen a permetezést a lárvakeelés időszakára időzítve ajánlott elvégezni.

Coragen 20 SC rovarölő szer
2025-től kiskultúrás engedélykirattal



An Agricultural
Sciences Company

Kultúra	Károsító	Kezelések évenkénti <u>maximális</u> száma	Két kezelés közt eltelt <u>minimális</u> időtartam (nap)	Dózis (ml/ha)	Vízmennyiség (l/ha)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
dohány	gyapottok- bagolylepke	2	14	125-150	300-800	virágbimbók megjelenésétől (BBCH 51) – az első betakarításig

Dohányban a *gyapottok-bagolylepke* elleni védekezést előrejelzésre (fénycsapdás, szexferomon csapdás megfigyelés, valamint tojáscsomó vizsgálat) alapozva, a lepkék tojásrakását követően, a tömeges lárvakelés előtt célszerű elvégezni. Elhúzódó rajzáskor vagy újabb nemzedék rajzásakor szükség lehet a permetezés megismétlésére.

Coragen® 20 SC (klórantraniliprol) rovarölő szer




An Agricultural
Sciences Company




✓ Hosszú tartamhatás


✓ Felszívódás és jó szállítódás



✓ Kiváló esőállóság



✓ Gyors táplálkozásleállítás, 2-4 napos teljes pusztulás



✓ Valódi tojásölő hatás

✓ Minden lárvastádium ellen hatékony



✓ Kíméli a hasznos szervezeteket



Nexsuba™ (spinozad) rovarölő szer



An Agricultural
Sciences Company

• 2024.01.10

Nexsuba™ Felhasználható szántóföldön, zárt termesztő-berendezésekben és gyümölcsösben

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	Dózis (l/ha)
Burgonya	burgonyabogár	3	0,15
Vöröshagyma	dohánytripsz	2	0,3
Újhagyma, póréhagyma	dohánytripsz	2	0,3
Káposztafélék	fehér lepkék, bagolylepkék lárvái	3	0,4
Paprika (szabadföldi)	tripszek	3	0,4
hajtatott paprika	nyugati virágtripsz, gyapottok-bagolylepke	3	0,04%
Hajtatott paradicsom	gyapottok-bagolylepke	3	0,04%
Hajtatott dísznövények	nyugati virágtripsz	3	0,04%
Szőlő	szőlőmolyok	3	0,2
	amerikai szőlőkabóca	2	0,4
Alma, körte, birsalma, naspolya	almamoly, aknázómolyok	3	0,5
Körte	körte -levélbolha	1	0,6-0,9

✓ **Biogazdálkodásban is alkalmazható**


Stresszoldás a
növényeknek.
És Önnek is.



RhizoMagic™

Folyékony növény- és talajkondicionáló, stresszoldó készítmény

Abiotikus stresszfaktorok




Nyári növényekre vonatkozó mezőgazdasági aszályszint 2022.07.08.

FMC

An Agricultural
Sciences Company

Nyári növényekre vonatkozó mezőgazdasági aszályszint

2022. július 8.





HungaroMet
Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Legszárazabb évek Magyarországon országos átlagban 1901 óta


1.	2011.	419,8 mm
2.	2000.	423,3 mm
3.	1971.	441,0 mm
4.	2025.	453,2 mm
5.	1917.	457,4 mm
6.	1983.	459,7 mm
7.	2003.	463,5 mm
8.	1921.	465,5 mm
9.	1947.	470,0 mm
10.	1961.	476,9 mm

Csapadékösszeg (mm) Magyarországon



An Agricultural
Sciences Company


2025. év



Az országos havi csapadékösszegek eltérése 2025-ben az 1991–2020-as átlagtól



An Agricultural
Sciences Company





HungaroMet
Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.


Legmelegebb évek Magyarországon országos átlagban 1901 óta

1.	2024.	12,94 °C
2.	2023.	12,26 °C
3.	2019.	12,09 °C
4.	2018.	11,97 °C
5.	2022.	11,86 °C
6.	2014.	11,85 °C
7.	2025.	11,78 °C
8.	2015.	11,61 °C
9.	2007.	11,54 °C
10.	2020.	11,49 °C


Az éves középhőmérséklet Magyarországon 1901 és 2025 között az 1991–2020-as átlaghoz képest



An Agricultural
Sciences Company



Abiotikus stresszfaktorok



Milyen készítményt válasszunk?

	<i>Szervesanyag</i>	<i>Alga</i>	<i>Aminosav</i>	<i>Makroelem</i>	<i>Mezo- és mikroelemek</i>	<i>Stresszoldás</i>	<i>Talaj-kondicionálás</i>
Standard 1				✓	✓		
Standard 2	✓						✓
Standard 3	✓	✓			✓	✓	✓
Standard 4	✓		✓			✓	
RhizoMagic™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FMC a stresszkezelésben: RhizoMagic™

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC

icultural
sciences Company



RhizoMagic stresszes dohányban

Ófehértó 2019.07.23.



Kezeletlen



RhizoMagic

RhizoMagic stresszes dohányban Ófehértó 2024.



07.01.



07.08.



09.11.

RhizoMagic stresszes dohányban Ófehértó 2024.

Termésátlag: 24,8 q/ha

167 ha



Hidegstresszes dohány Ófehértó, 2025.05.12.



RhizoMagic™ hidegstresszes dohányban

Ófehértó, 2025.06.12.



RhizoMagic™ hidegstresszes dohányban

Ófehértó, 2025.07.11.



RhizoMagic™ hidegstresszes dohányban Ófehértó, 2025.07.30.



RhizoMagic™ hidegstresszes dohányban Ófehértó, 2025.09.18.



Termésátlag: 2,74 t/ha



RhizoMagic™ dohányban

Levelek, 2025.08.01.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC

An Agricultural
Sciences Company



Termésátlag:

3 t/ha

RhizoMagic™ dohányban
Levelek, 2025.08.01.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC

An Agricultural
Sciences Company

Termésátlag: 3 t/ha



RhizoMagic™ dohányban
Levelek, 2025.08.01.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC

An Agricultural
Sciences Company



RhizoMagic™ dohányban

Levelek, 2025.08.01.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC

An Agricultural
Sciences Company



Termésátlag:

3 t/ha

RhizoMagic™ dohányban
Levelek, 2025.08.01.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC

An Agricultural
Sciences Company

Termésátlag: 3 t/ha



RhizoMagic™ dohányban
Levelek, 2025.08.01.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC

An Agricultural
Sciences Company



RhizoMagic™ víznyomott búzában Tiszavasvári, 2025.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company




04.08.

RhizoMagic: 2 l/ha
gyomirtással 04.24.



05.30.



Termésátlag:
6,9 t/ha

RhizoMagic™ őszi búzában

Levelek 2025.06.11.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company

Gombaölő kezelésekkel:
2 x 2 l/ha

Termésátlag: 7,4 t/ha



RhizoMagic™ őszi búzában

Levelek 2025.06.11.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company

Gombaölő kezelésekkel:
2 x 2 l/ha

Termésátlag: 7,4 t/ha



RhizoMagic™ aszálystresszes napraforgóban Csegöld, 2025.07.31.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC An Agricultural
Sciences Company



RhizoMagic™ napraforgóban

Tarpa, 2025.07.01.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company



RhizoMagic: gyomirtással 2 l/ha

Termésátlag: 4,1 t/ha



RhizoMagic™ napraforgóban

Tarpa, 2025.07.01.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company

Termésátlag: 4,1 t/ha



RhizoMagic: gyomirtással 2 l/ha



RhizoMagic™ napraforgóban Tiszavasvári, 2025.08.28.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC An Agricultural
Sciences Company

Termésátlag: 5,23 t/ha



RhizoMagic: gyomirtással 2 l/ha



RhizoMagic™ hidegstresszes silókukoricában Nyírbátor 2025.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC An Agricultural
Sciences Company

06.13.

07.31.



RhizoMagic™ hidegstresszes silókukoricában Nyírbátor 2025.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company

06.13.

07.31.



RhizoMagic™ hidegstresszes silókukoricában Nyírbátor 2025.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC An Agricultural
Sciences Company

07.31.

Termésátlag: 34 t/ha

07.31.



RhizoMagic™ hidegstresszes kukoricában Tiszavasvári 2025.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company



Termésátlag: 13 t/ha



RhizoMagic: májusi fagyok után 2 l/ha
Fotó: 06.19.

RhizoMagic™ hidegstresszes kukoricában Tiszavasvári 2025.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC An Agricultural
Sciences Company



Termésátlag: 13 t/ha



RhizoMagic: májusi fagyok után
2 l/ha Fotó: 06.19.

RhizoMagic™ aszályos kukoricában Kisvárdá 2025.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company



RhizoMagic: júniusban 6-8 levélben
2 l/ha Fotó: 07.02.

Termésátlag: 13 t/ha



RhizoMagic™ aszályos kukoricában Kisvárdra 2025.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company



Termésátlag: 13 t/ha



RhizoMagic: júniusban 6-8 levélben
2 l/ha Fotó: 07.02.

RhizoMagic™ aszályos szójában

Tiszavasvári, 2025.08.28.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC An Agricultural
Sciences Company

Termésátlag: 3,2 t/ha



RhizoMagic: 2 l/ha



RhizoMagic™ aszályos szójában

Tiszavasvári, 2025.08.28.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company



Termésátlag: 3,2 t/ha



RhizoMagic™ hidegstresszes almában Tiszadada, 2025.06.04.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company



RhizoMagic™ almában

Rakamaz, 2025.04.04.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company



RhizoMagic™ almában

Rakamaz, 2025.09.19.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company



RhizoMagic™ almában

Rakamaz, 2025.10.08.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company



Videóriport Rakamaz Takács János

RhizoMagic™ hidegstresszes meggyben Csegöld, 2025.06.20.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC An Agricultural
Sciences Company

Termésátlag: 10,7 t/ha



RhizoMagic™ hidegstresszes, aszályos szilvában Csegöld, 2025.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC An Agricultural
Sciences Company



07.31.

RhizoMagic™ hidegstresszes,
aszályos szilvában Csegöld, 2025.

BIOLOGICALS
by
FMC

FMC
An Agricultural
Sciences Company

Termésátlag: 18,3 t/ha

08.26.



RhizoMagic™ talaj- és növénykondicionáló, stresszoldó és levéltrágya készítmény



- Összetevők széles köre -
(szerves anyag, NPK, mikro- és mezoelemek, alga, aminosav, növényi hormonok, mannit, fucoidan, laminarin, tannin, poliszacharidok, polifenolok stb.)
- Biológiai többlethatás/szinergizmus
(A biológiai összetevők segítik a tápanyagok bejutását)
- Sokféle stressz ellen
(aszály-belvíz, fagy-hőségnapok, jégverés-viharkár, gyomirtó stressz stb.)
- Stresszmentes állományokban is rentábilis
(fokozott anyagcsere - több termés, homogén állomány - jobb minőség)
- Talaj- és állománykezeléssel egyaránt kijuttatható
- Egyéb készítményekkel jól keverhető – technológiákba illeszthető
- Kondicionáló készítményként az AÖP programban 1 pontot ér.



An Agricultural
Sciences Company



An Agricultural
Sciences Company

VAN ÚJ A NAP ALATT!

**Mostantól elérhető
az Online TudásTÁR!**

www.fmcagro.hu/tudastar/rhizomagic



Szakmai
tudást adunk

STRESSZOLDÁS A NÖVÉNYNEK. ÉS ÖNNEK IS.

Miben és hogyan segíthet a RhizoMagic™?

Ha szeretné megtudni, hogy az Ön területén vagy az Ön által termesztett növényekben milyen eredményeket tapasztaltak a gazdálkodók különböző évjáratokban a RhizoMagic™ használatával, kattintson a részletekért!

FOR GENERATIONS OF GROWERS

RhizoMagic™ Online Szakmai Tudástár

Az online Tudástárat azért hoztuk létre, hogy könnyen kezelhető formában rendszerezzük, hogy az Ön területén vagy termesztett növényeiben milyen eredményeket tapasztaltak a gazdálkodók különböző évjáratokban a RhizoMagic™ használatával 2019 óta.

Az év, hely, kultúra és a kezelés okának kiválasztásával szűkítheti a keresési eredményeket. Kezelés okaként különböző abiotikus stressztényezőkre (pl. aszály, belvíz, jégkár) külön-külön tud szűrni, míg technológiai tapasztalatokért a növénykondicionálást érdemes kiválasztani az eredmények megtekintéséhez. Tudástárunk folyamatosan bővítjük, így érdemes visszatérni később is további adatok ellenőrzéséért!

- Év -

- Hely (vármegye)

- Kultúra -

- Kezelés oka -

Keresés

Online TudásTár

RhizoMagic™ Online TudásTár

Az online Tudástárat azért hoztuk létre, hogy könnyen kaphasson információkat az eredményekről, amelyeket tapasztaltak a gazdálkodók különböző években.

Az év, hely, kultúra és a kezelés okának kiválasztásával szűrheti az adatokat, majd a talajvizet, a jégkár) külön-külön tud szűrni, míg technológiai adatokat is. Tudástárunk folyamatosan bővítjük, így érdemes visszatérni.

Borsó
Burgonya
Cukorrépa
Dohány
Kajszi
Káposzta
Körte
Kukorica
Meggy
Napraforgó
Őszi árpa
Őszi búza
Paprika
Paradicsom
Repce
Szilva
Szója

Tudástár

Az online Tudástárat azért hoztuk létre, hogy könnyen kaphasson információkat az eredményekről, amelyeket tapasztaltak a gazdálkodók különböző években.

Az online Tudástárat azért hoztuk létre, hogy könnyen kaphasson információkat az eredményekről, amelyeket tapasztaltak a gazdálkodók különböző években.

RhizoMagic

Online TudásTár

+1 pont

RhizoMagic™ Online Szakmai TudásTár

Az online TudásTárat azért hoztuk létre, hogy könnyen kezelhető formában rendszeresen frissülő eredményeket tapasztaltak a gazdálkodók különböző évjáratokban a RhizoMagic

Az év, hely, kultúra és a kezelés okának kiválasztásával szűkítheti a keresési eredményeket. Az év, hely, kultúra és a kezelés okának kiválasztásával szűkítheti a keresési eredményeket. Az év, hely, kultúra és a kezelés okának kiválasztásával szűkítheti a keresési eredményeket. Az év, hely, kultúra és a kezelés okának kiválasztásával szűkítheti a keresési eredményeket.

- Kezelés oka -

abiotikus stressz
aszálystressz
belvíz
fagykár
gyenge kelés
gyenge talaj
gyomirtóstressz
heterogén állomány
hidegstressz
homokverés
hőstressz
jégverés
kései vetés
növénykondicionálás
szárazság
szél- és fagykár
technológiai hiba
vadkár
viharkár

területén vagy termesztett növényeiben milyen
a.

különböző abiotikus stressztényezőkre (pl. aszály,
szárazság) kiválasztani az eredmények megtekintéséhez.

- Év -

- Hely (vármegye) -

- Kultúra -

- Kezelés oka -

Keresés

Köszönöm a figyelmet.

Eredményes dohánytermesztést kívánok!

További információ:

Rácz Tibor

20 9438-698

tibor.racz@fmc.com

www.fmcagro.hu